Sana Dreifaltigkeits-
Krankenhaus Köln

Nachbehandlung HKB-Ersatz

Patientenetikett

Prof. Dr. med. Sven Shafizadeh
Chefarzt
Klinik für Spezielle
Sporttraumatologie und Unfallchirurgie

Sekretariat:
Frau Alexandra Blönigen-Pelzer
Tel.: 0221 94071-245
Fax: 0221 94071-1039
E-Mail: alexandra.bloenigen-pelzer@sana.de

*** Besonderheiten**

Schiene/Orthese: ☐ nicht erforderlich ☐ Mecronschiene ☐ PTS-Schiene ☐ X-Lock-Orthese ☐ PCL Rebound

Belastung: ☐ frei/funktionell ☐ axial in Mecron/Orthese für 6 Wochen

☐ schmerzadaptierter Belastungsaufbau
☐ Teilbelastung mit 30% KG für ____Wochen, dann schmerzadaptierter Belastungsaufbau
☐ Entlastung für ____Wochen, dann schmerzadaptierter Belastungsaufbau

Funktion: ☐ freie funktionelle Nachbehandlung
☐ funktionelle Nachbehandlung bis 90° für 6 Wochen, dann freie funktionelle Nachbehandlung
☐ funktionelle Nachbehandlung für 2 Wochen bis 30°, dann alle 2 Wochen um 30° steigern.

1. Woche	• Schonung, Bein hoch lagern, ggf. kühlen, feuchte US-Wickel oder US- Quarkauflage (cave: Wunden) • Vollstreckung, ggf. mit Fersenkissen; Fußhebe-/Senkübungen zur Thromboseprophylaxe • Beginn mit schmerzadaptierten funktionellen Übungen (aktive Knieflexion möglich oder *) • Abschwellende Maßnahmen & Kompressionsstrumpf (Kl. 2) • Quadrizepsinnervation (Hochziehen d. Patella), Patellamobilisation • Orthese/Schiene sowie Belastungsaufbau s.o.
2.-3.Woche	• Aktiv geführte und passive Bewegungen in Bauchlage (Ziel: 0-0-60° oder *) • Gangschule & schmerzadaptierter axialer Belastungsaufbau in PTS oder PCL Rebound an UAGST • Fortführung abschwellende Maßnahmen und Kompressionsstrumpf (Kl. 2) • Intensivierung Quadrizepsinnervation & Patellamobilisation, -querfriktion • Gluteal-/Hüftrotationstraining (Abduktion & ARO Hüftgelenk in Seitenlage mit PTS Schiene) • Beginn Propiozeptionstraining in der statischen Beinachse
4.-6. Woche	• Aktiv geführte und passive Bewegungen in Bauchlage (Ziel: 0-0-90° oder *) • Gangschule mit axialem Belastungsaufbau in PTS oder PCL Rebound (Unterarmgehstützen abtrainieren); • Fortführung Propiozeptionstraining in der statischen Beinachse (incl. 2-Bein Aufstehen, 2-Beinpresse, …)
ab 7. Woche	• Beginn funktionelle Übungen (Bauch- & Rückenlage; Ziel: Wiedererlangung der freien aktive Funktion) • ADL verletztes System dosiert auf Alltagsbelastung vorbereiten • Beginn Krafttraining (incl. 1-Bein Aufstehen, 1- & 2-Beinpresse, Squats, …) • Beginn zyklische funktionelle Bewegung: Fahrradergometer (Sattelerhöhung und Kurbelverkürzung) • Muskulatur-/Kraft-/Koordinationsaufbau zur Sicherung der Bewegungsabläufe innerhalb der statischen Beinachse
ab 10. Woche	• Forciertes Propiozeptionstraining in der dynamischen Beinachse • Fahrradergometer, Krafttraining, Isokinetik • Medizinische Trainingstherapie mit forciertem Muskulatur-/Kraft-/Koordinationsaufbau (s.o.) • Funktionelles Training mit Dehnungs-/Verkürzungszyklus: Sprünge, Drehen, Mini-Trampolin… • Steigerung aller konditionellen Fähigkeiten: Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit…
Sport	Beginn mit sportartspezifischem Training ab 7. Monat (wenn Kniegelenk reizfrei, frei beweglich und mindestens 80% der Muskelkraft wieder aufgebaut sind! Low pivoting Sport (Tennis, Ski, …): 9 Monate postOP; high pivoting Sport (alle Kontaktsportarten): 12 Monate postOP

Prof. Dr. med. Sven Shafizadeh