



[www.onkonetrheinmain.de](http://www.onkonetrheinmain.de)

## Aktuelle Therapiestudien in der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe Sana Klinikum Offenbach GmbH

Stand 10.05.2021

### Endometriumkarzinom

#### ECLAT

Pelvine und paraaortale Lymphadenektomie bei Patientinnen mit Endometriumkarzinom Stadium I oder II mit hohem Rezidivrisiko. Eine multizentrische, prospektive randomisierte kontrollierte Studie

<http://www.ago-ovar.de/>

**Arm A:** Standard Operationsverfahren bei Endometrium Karzinom: totale Hysterektomie, bilaterale Salpingo-Oophorektomie, Omentektomie (Typ 2 Krebserkrankung)

**Arm B:** zusätzlich zu den Standard Operationsverfahren, wie definiert für Arm A:  
Systematische pelvine und paraaortale Lymphadenektomie (LNE) bis zu den Nierengefäßen

#### Einschlußkriterien:

1. Histologisch bestätigtes EC klinisches Stadium T1b und T2, (alle histologischen Typen) und Stadium T1a G3 Typ 1 (endometrioid, endometrioid mit squamöser Differenzierung, mukös) oder Typ 2 Tumore (jeder Prozentsatz von seriösen oder klarzelligen Komponenten) oder Karzinosarkom
2. A) keine vorhergehende Operation bezüglich EC (primäre OP) **oder** B) OP nach Hysterektomie (z.B. bei vermutetem EC mit einem geringen Risiko) ist erlaubt innerhalb von 8 Wochen nach Hysterektomie, wenn keine LNE erfolgt ist (sekundäre Operation)
3. Keine vergrößerten Lymphknoten

Endometriumkarzinom  
(Stadium I und II)

## Aktuelle Therapiestudien in der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe Sana Klinikum Offenbach GmbH


Stand 10.05.2021

### Endometriumkarzinom

#### RUBY

Eine randomisierte, doppelblinde, multizentrische Studie der Phase III zu Dostarlimab (TSR-042) plus Carboplatin-Paclitaxel im Vergleich zu Placebo plus Carboplatin-Paclitaxel bei Patientinnen mit wiederkehrendem oder primärem Endometriumkarzinom in fortgeschrittenem Stadium

Primäres oder wiederkehrendes Endometriumkarzinom



#### Wichtige Einschlusskriterien:

- Histologisch oder zytologisch nachgewiesenes wiederkehrendes oder fortgeschrittenes Endometriumkarzinom
- Primäres Endometriumkarzinom im Stadium III oder IV oder das erste Auftreten des Karzinoms mit einer geringen Wahrscheinlichkeit der Heilung
- Ausreichend Tumormaterial für die MSI-Status-Testung
- ECOG 0 oder 1
- Adäquate Organfunktion (Blutbild etc.)