



www.onkonetrheinmain.de


Aktuelle Therapiestudien in der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe Sana Klinikum Offenbach GmbH

Stand 15.09.2020

Ovarialkarzinom

COMPASS

Vergleich der Lebensqualität bei Patientinnen mit platin sensitivem rezidierten Ovarial-, Eileiter- und Bauchfellkarzinom bei der Behandlung mit Trabectedin/PLD oder einer platinbasierten Standardtherapie (Phase IV-Studie)



Ovarial- Eileiter und Bauchfellkarzinom / prospektive Studie zur Lebensqualität

Wichtige Einschlusskriterien:

- Patienten mit histologisch gesicherter Diagnose von epithelalem Eierstockkrebs, primärem Peritonealkarzinom oder Eileiterkrebs, die bereits ≥ 1 vorherige Chemotherapie erhielten
- Patienten müssen für eine platinhaltige Therapie geeignet sein; Patienten, die in der vorherigen Therapielinie eine platinfreie Therapie erhalten haben, sind ebenfalls geeignet, wenn Sie für eine platinhaltige Therapie in Frage kommen.
- Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) Leistungsstatus von ≤ 2
- Ausreichende Herzfunktion definiert als linksventrikuläre Ejektionsfraktion (LVEF) $\geq 50\%$, bestimmt mittels Echokardiogramm